

外用殺菌消毒薬
ノルバサン[®] サージカルスクラブ
Nolvasan[®] Surgical Scrub
動物用医薬品

ノルバサン サージカルスクラブは酢酸クロルヘキシジンを主成分とする手術野の殺菌消毒薬で、洗浄及び浸潤を補足する界面活性剤を含み、青色又は青緑色を呈する粘稠で芳香を有する液剤です。本剤は細菌、真菌、ウィルス等広範囲の微生物に対し殺菌作用を有し、作用機序は細胞蛋白質への結合によるもので、そのため効果の持続時間も長くなります。

【組成】

ノルバサン サージカルスクラブ100mL中
酢酸クロルヘキシジン 2.0g含有

【効能・効果】

犬又は猫の手術野の殺菌消毒

【用法用量】

通常、本剤1～5mLを手術野に塗布し、滅菌ガーゼ等で2～4分間擦り洗いした後、滅菌水で洗い落とし、滅菌タオル等で拭き取る。

【使用上の注意】

【一般的注意】

- (1) 本剤は効能・効果において定められた適応のみに使用すること。
- (2) 本剤は犬及び猫用なので、他の動物種には使用しないこと。

【使用者に対する注意】

目に入らないよう注意すること。誤って入ってしまった場合は直ちに流水を使用して十分洗浄し、医師の診断を受けること。

【対象動物に対する注意】

1 制限事項

本剤はクロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴が有る動物に使用しないこと。
また、薬物過敏体质の動物には慎重に適用すること。

2 副作用

- (1) 本剤の適用により、まれにショック症状が現れることがあるので、観察を十分に行い、恶心、不快感、冷汗、眩暈、胸内苦悶、呼吸困難等の症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- (2) 本剤の適用により、まれに発赤、発疹、蕁麻疹、腫脹等の過敏症状がみられることがあるので、このような症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、以後、本剤を使用しないこと。

3 適用上の注意

- (1) 本剤は外用以外に使用しないこと。誤飲した場合には胃洗浄を行うなど適切な処置を行うこと。誤って静注した場合には溶血反応を防ぐために輸血など適切な処置を行うこと。
- (2) 本剤が術野から直接または器具等を介して脳、脊髄、耳(内耳、中耳)、腎、膀胱、眼等の体腔内及び粘膜面に付着すると、神経障害、難聴、ショック症状が起こることがあるので注意すること。
- (3) 毛刈りした術野に付着している汚れは、適用前にあらかじめ水道水などの浄水を流しながら洗い落とすこと。
- (4) 泡立ちが不十分な時は、水または本剤を追加して、十分泡立つよう調整すること。

【取扱い上の注意】

- (1) 有効期限内に使用すること。
- (2) 本剤は原液のまま使用することを原則とするが、希釈適用する場合には、当該使用分のみを希釈適用し、希釈残液は必ず廃棄すること。希釈残液を原液に戻したり、保管したりしないこと。
- (3) 使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従って処分すること。
- (4) 変色を認められた場合には使用しないこと。

【保管上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 本剤の保管は直射日光、凍結、高温及び多湿を避けること。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。