

イル ス キ ン

本剤主剤のプレドニゾロンは合成副腎皮質ホルモンで、炎症を静める優れた効果があります。さらに、治療を早めるために抗ヒスタミン剤と麻酔作用によって鎮痛効果をあらわす薬剤を加えた愛犬及び愛猫用の皮膚病治療薬です。

特 長

本剤は刺激性が少なく、強力なカユミ止めと痛み止め作用をもち、抗炎症作用と相まって症状を軽減させ、治療を早めます。

効能・効果

犬及び猫の湿疹、じんま疹、アレルギー性皮膚炎、^{そうよう}掻痒性皮膚炎

用法・用量

犬または猫の患部に1日1～3回塗布する。
1回当りの用量は5mL以内とする。

成 分

本剤 100mL中 プレドニゾロン…………… 100mg 塩酸ジフェンヒドラミン… 1,000mg
アミノ安息香酸エチル… 300mg

【一般的注意】

- (1) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤は効能・効果において定められた適応症の治療のみに使用すること。

【対象動物に対する注意】

1. 副作用

- (1) 本剤は実験動物において催奇形性を示したとの報告がある。
- (2) 本剤の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、獣医師等に相談すること。

2. 適応上の注意

- (1) 本剤は外用のみに使用し、内服しないこと。
- (2) 患畜の目に入らないように注意すること。万一入った場合は、直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。
- (3) 次の場合は使用前に獣医師等に相談すること。
 - イ) 今までに薬によるアレルギーを起こしたことがある場合。
 - ロ) 患部が広範囲の場合。
 - ハ) 深い傷やひどい火傷の場合。
 - ニ) 獣医師の治療を受けている場合。
 - ホ) 数日間使用しても症状の改善が見られない場合。

【取扱い上の注意】

- (1) 誤用を避け、品質を保持するために他の容器に入れ換えないこと。

【保管上の注意】

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。



製造販売元

内外製薬株式会社

〒639-2200 奈良県御所市1568番地

<http://www.naigai-pet.com>

TEL: 0745-65-1156

(9:00～17:00 土、日、祝日は除く)