

ペットの目薬

動物用・ドラマ®

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

動物用医薬品

ペットの目薬

動物用・ドラマ®



〔成分・分量〕 15mL中

塩酸ナファゾリン0.45mg
グリチルリチン酸二カリウム6mg
マレイン酸クロルフェニラミン3mg

〔効 能〕

結膜炎、結膜充血、角膜炎、涙腺炎、眼瞼炎、外傷性眼炎

〔用法・用量〕

1日3～6回、1～3滴の範囲で点眼してください。

〔成分の働き〕

塩酸ナファゾリン	血管を収縮させることにより、充血を抑えます。
グリチルリチン酸二カリウム	目やまぶたの炎症や充血、ただれを鎮めます。
マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン作用により、炎症による目のかゆみを抑えます。

★裏面につづく

【使用上の注意】

〔一般的注意〕

- (1) 本剤は定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用してください。

〔対象動物に対する注意〕

- (1) 数日間使用しても症状の改善がみられない場合、使用を中止して獣医師にご相談ください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は速やかにご使用ください。
- (5) 温度40℃以上となる所に置かないでください。自動車の車内（ダッシュボードなど）や暖房器具の近くなどに放置すると、容器が変形することがあります。
- (6) 容器の先が、まぶたやまつ毛等に触れると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間:9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

4